

sommairement décrite, mais non nommée, par REITTER, et d'origine inconnue.

Observations. — La dimension relative des yeux qu'indique la fig. 1 n'a pas d'importance générique : chez plusieurs *Gonocephalum* ils ne sont pas plus grands que chez le *Mesomorphus* figuré. De même le plus ou moins de saillie de la languette est un caractère purement accidentel. Il faut signaler enfin que chez certains *Gonocephalum* (en particulier les espèces appartenant au groupe de l'*aequatoriale* Blanch.) les ailes latérales du menton sont sensiblement plus larges et plus visibles que chez le *G. micans* Germ., figuré (fig. 2), sans être jamais aussi développées et aussi aiguës que chez les *Mesomorphus*.

Anthicides exotiques nouveaux [COL. HETEROMERA]

par Maurice Pic.

Notoxus quinquemaculatus, n. sp. — *Modice elongatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, rufo-testaceus, oculis antennisque apice nigris, elytris brunneo quinquemaculatis, macula media ad suturam posita.*

Modérément allongé, brillant, orné d'une pubescence grise et de quelques poils clairs dressés; roux testacé avec les yeux et l'extrémité des antennes noirs; élytres ornés de cinq macules brunes dont la médiane commune sur la suture, les autres macules isolées sont placées : deux avant et deux en arrière du milieu, les antérieures étant plus rapprochées de la suture que les postérieures. Prothorax robuste, impressionné à la base, à corne grande, faiblement crénelée; élytres pas très longs, à peine élargis au milieu, un peu rétrécis et subarrondis au sommet, assez finement ponctués. Long. 4 mill.

Jamaïque (coll. Pic.)

Voisin de *N. bipunctatus* Chev., corne plus large, macules des élytres plus nombreuses, etc.

Formicomus travancorensis, n. sp. — ♂. *Elongatus, nitidus, griseo-pubescens, rubro-testaceus, elytris nigro-virescentibus, abdomine femoribusque posticis obscuris.*

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise espacée et de poils

redressés sur les élytres, testacé-rougeâtre, avec les élytres d'un noir verdâtre, l'abdomen et les cuisses postérieures obscurcis. Tête grosse, assez rétrécie derrière les yeux qui sont noirs; antennes longues, testacées; prothorax plus long que large, nettement élargi vers le milieu, fortement ponctué sur le disque; élytres plus larges que le prothorax, un peu élargis au milieu, atténués postérieurement, subarrondis au sommet, à ponctuation fine et écartée; cuisses robustes, antérieures munies d'une large dent tronquée au sommet, tibias légèrement sinués. Long. 6 mill.

Indes Malaises : Wallardi (coll. Pic).

Voisin de *F. Corbetti* Pic, en diffère par la tête testacé-rougeâtre, la coloration moins verte des élytres qui sont, en outre, moins pubescents.

Anthicus robustithorax, n. sp. — *Subparallelus, nitidus, fere glaber, rufescens, oculis nigris, elytris postice late nigro brunnescentibus.*

Subparallèle, brillant, presque glabre, roussâtre, avec le prothorax et les membres plus clairs et environ les deux tiers postérieurs des élytres rembrunis. Tête large, subarquée postérieurement, à ponctuation forte, assez rapprochée, avec une faible carène médiane lisse; yeux noirs; antennes grêles, assez longues; prothorax robuste, trapézoïdiforme, à angles antérieurs subarrondis, à ponctuation assez forte et rapprochée; élytres peu plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles, conjointement arrondis au sommet, à ponctuation analogue à celle du prothorax mais plus écartée; cuisses un peu épaissies. Long. 2,5 mill.

Afrique australe : Rhodesia (coll. Pic).

Cette espèce, qui offre la coloration de *A. floralis* L. avec une forme différente, peut prendre place près de *A. trapezithorax* Pic, dont elle est très distincte par la coloration et la forme plus allongée.

Description d'un *Bythinus* nouveau de France

[COL. PSELAPHIDAE]

par J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Bythinus* (*Bythinopsis* Raffr.) *Lavagnei, n. sp. — ♂. — *Rufotestaceus, nitidus, pube pallida longiuscula, arcuata, vestitus; oculis*